

# Arzneimitteltabelle für antiretrovirale Substanzen

## MOLEKÜLE ZUR KOMBINATION MIT ANDEREN

Kürzel	Moleküle	Produkte	Formen	Standarddosis Erwachsene	Nebenwirkungen
<b>ENTRY-INHIBITOREN</b>					
FTR	Fostemsavir	Rukobia (ViiV)	Tabletten: 600 mg	1 Tabl. 2× täglich	Gut verträglich, selten Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall. Selten Hautausschlag. Nicht während Schwangerschaft empfohlen.
MVC	Maraviroc	Celsentri (ViiV)	Tabletten: 150 mg, 300 mg	300 mg 2× täglich oder 150 mg 2× täglich mit RTV oder Cobi oder 600 mg 2× täglich mit EFV oder ETV	Gut verträglich, selten Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit.
<b>NUKLEOSIDISCHE REVERSE-TRANSKRIPTASE-INHIBITOREN (NRTI)</b>					
3TC	Lamivudin	3TC oder EpiVir (ViiV)	Tabletten: 150 mg, 300 mg, Lösung zum Einnehmen 10 mg/ml (Flasche 240 ml)	1 Tabl. 150 mg 2× täglich oder 1 Tabl. 300 mg 1× täglich	Kaum Nebenwirkungen.
AZT	Zidovudin	Retrovir (ViiV)	Kapseln: 250 mg	1 Kaps. 2× täglich	Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl, Kopf- und Muskelschmerzen.
ABC	Abacavir	Ziagen (ViiV) Generika verfügbar nur in Fixkombination	Tabletten: 300 mg, Lösung zum Einnehmen: 20 mg/ml (Flasche 240 ml)	300 mg 2× täglich oder 600 mg 1× täglich	Selten Hausausschlag, Übelkeit, Durchfall. Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung, insbesondere Herzinfarkte. Nicht als Postexpositionsprophylaxe empfohlen. Gabe nur bei negativer HLA B-57 Bestimmung.
FTC	Emtricitabin	Emtriva (Gilead) Generika Verfügbar nur in Fixkombination	Kapseln: 200 mg	1 Tabl. 1× täglich	Kaum Nebenwirkungen.
TAF	Tenofovir afenamid furamat	Verfügbar nur in Fixkombination	Tabletten: 10 mg, 25 mg	1 Tabl. 1× täglich	Meist gut verträglich, teilweise Gewichtszunahme, Lebersteatose (erhöhtes Risiko), erhöhter Cholesterinspiegel.
TDF	Tenofovir disoproxil furamat	Original: Viread (Gilead) Generika: Mepha, Mylan, Sandoz	Tabletten: 245 mg	1 Tabl. 1× täglich, ¶	Meist gut verträglich, selten renale Nebenwirkungen und Abnahme der Knochendichte in Kombination mit Protease-Hemmern, leichter Gewichtsverlust.
<b>NICHT-NUKLEOSIDISCHE REVERSE-TRANSKRIPTASE-INHIBITOREN (NNRTI)</b>					
DOR	Doravirin	Pifeltro (MSD)	Tabletten: 100 mg	1 Tabl. 1× täglich	Relativ gut verträglich, sehr selten Kopfschmerzen, gastrointestinale Beschwerden und Hautausschlag.
EFV	Efavirenz	Original: Stocrin/ Sustiva (MSD) Generika: Mepha, Sandoz, Arrow, Mylan, Teva	Tabletten: 600 mg	1 Tabl. 1× täglich, ¶ Abends, vorzugsweise vor dem Schlafengehen Einnahme mit einer fetthaltigen Mahlzeit vermeiden	In den ersten Wochen häufig Alpträume, Verwirrtheit, Schwindel, Benommenheit, Depression, Konzentrationsstörung, Schlaflosigkeit sowie Fettstoffwechselstörung und selten Hautausschlag.
ETV	Etravirin	Intence (Janssen)	Tabletten: 200 mg	1 Tabl. 2× täglich oder 2 Tabl. 1× täglich, nach ¶	Selten milder Hautausschlag in der zweiten Woche, selten Übelkeit. Wenig Daten über die Anwendung während der Schwangerschaft.
NVP	Nevirapin	Original: Viramune (Boehringer) Generika: Mylan, Sandoz, Mepha	Tabletten: 200 mg, Retardtabletten: 400 mg	1 Tabl. 200 mg 2× täglich 1 Retardtabl. 400 mg 1× täglich	Häufig Hautausschlag. Nicht während Schwangerschaft und nicht als Postexpositionsprophylaxe empfohlen.
RPV	Ralpivirin	Edurant (Janssen)	Tabletten: 25 mg	1 Tabl. 1× täglich, ¶	Selten Nebenwirkungen, am ehesten Hautausschlag sowie gelegentlich Übelkeit, Depression, Schlafstörung, Kopfschmerzen. Kontraindiziert mit Magensäureblockern.
		Rekamby (Janssen)	Depot Injektionsusp. 900 mg/3 ml	1 Injektion IM/2 Monate (kombiniert mit Cabotegravir)	Selten Nebenwirkungen, am ehesten Hautausschlag sowie gelegentlich Übelkeit, Depression, Schlafstörung, Kopfschmerzen.
<b>INTEGRASE-INHIBITOREN (INI)</b>					
BIC	Bictegravir	Verfügbar nur in Fixkombination	Tabletten: mit 50 mg BIC	1 Tabl. 1× täglich	Insgesamt gut verträglich, zum Teil Gewichtszunahme. Selten Schlafstörungen und Kopfschmerzen. Wenig Daten über die Anwendung während der Schwangerschaft.
			Tabletten: 30 mg	1 Tabl. 1× täglich (kombiniert mit Rilpivirin)	Selten Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Fieber.
CAB	Cabotegravir	Vocabria (ViiV)	Depot Injektionsusp. 600 mg/3 ml	1 Injektion IM/2 Monate (kombiniert mit Rilpivirin)	Selten Reaktionen an der Injektionsstelle, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Fieber.
DTG	Dolutegravir	Tivicay (ViiV)	Lösliche Tabletten: 5 mg Filmtabletten: 10 mg, 25 mg, 50 mg	Lösliche Tabletten: 5 mg Filmtabletten: 10 mg, 25 mg, 50 mg	Gelegentlich Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und Gewichtszunahme. Selten Hautausschlag, Übelkeit.
EVG/c	Elvitegravir und Cobicistat	Verfügbar nur in Fixkombination	Tabletten: mit 150 mg EVG und 150 mg Cobi	1 Tabl. 1× täglich, ¶	Gut verträglich, am ehesten Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen, Schlafstörung. Selten Gewichtszunahme. Wenig Daten über die Anwendung während der Schwangerschaft.
RAL	Raltegravir	Isentress (MSD)	Tabletten: 400 mg, 600 mg Kautabletten: 25 mg, 100 mg	1 Tabl. 400 mg 2× täglich oder 2 Tabl. 600 mg 1× täglich	Gut verträglich, gelegentlich Gewichtszunahme. Selten Schwindel, Schlafstörungen, Kopfschmerzen und erhöhte Leberwerte.
<b>PROTEASE-INHIBITOREN (PI)</b>					
ATV	Atazanavir	Original: Reyataz (BMS) Generika: Mepha	Kapseln: 150 mg, 200 mg und 300 mg	400 mg 1× täglich oder 300 mg + 100 mg RTV 1× täglich, ¶	Häufig gelbe Augen (erhöhtes Billirubin), Übelkeit und Durchfall. Relativ selten Kopfschmerzen und Gewichtszunahme. Selten Nierensteine. Kontraindiziert mit Magensäureblockern.
DRV	Darunavir	Original: Prezista (Janssen) Generika: Mepha, Mylan, Sandoz	Tabletten: 400 mg, 600 mg und 800 mg, Lösung zum Einnehmen	800 mg + 100 mg RTV 1× täglich oder 600 mg + 100 mg RTV 2× täglich oder 800 mg + 150 mg Cobi 1× täglich (in Kombination mit TAF+FTC), ¶	Häufig Übelkeit und Durchfall. Selten Hautausschlag, Nierenstein, Gewichtszunahme.
FPV	Fosamprenavir	Telzir (ViiV)	Tabletten: 700 mg	1 Tabl. 2× täglich + 100 mg RTV 2× täglich	Häufig Durchfall und Gewichtszunahme, selten Hautausschlag und Übelkeit. Nicht während Schwangerschaft empfohlen. Kontraindiziert mit Sildenafil (z.B. Viagra).
LPV/r	Lopinavir und Ritonavir	Kaletra (AbbVie)	Tabletten: 100 mg, 200 mg Sirup: 80 mg oder 20 mg/ml	400 mg + 100 mg RTV 2× täglich	Häufig Übelkeit und Durchfall sowie Gewichtszunahme.
TPV	Tipranavir	Aptivus (Boehringer Ingelheim)	Tabletten: 250 mg	2 Tabl. 2× täglich + 200 mg RTV 2× täglich	Vor allem Durchfall und Übelkeit, selten Hautausschlag.
<b>BOOSTER</b>					
Cobi oder/c	Cobicistat	Tyboost (Gilead)	Tabletten: 150 mg	Zum Verstärken (Boostern) anderer Protease-Inhibitoren (PI): 150 mg, ¶	Häufig Übelkeit und Durchfall, selten Gewichtszunahme. Alle Kombinationen mit Cobicistat sollten während einer Schwangerschaft vermieden werden.
RTV oder/r	Ritonavir	Norvir (AbbVie)	Tabletten: 100 mg	Zum Verstärken (Boostern) anderer Protease-Inhibitoren (PI): 100 mg, ¶	Häufig Übelkeit und Durchfall sowie Gewichtszunahme.

## FIXKOMBINATIONEN MIT 2 MOLEKÜLEN

Kürzel	Moleküle	Produkte	Formen	Standarddosis Erwachsene	Nebenwirkungen
<b>FIXKOMBINATION AUS 2 NRTI</b>					
3TC und ABC	Lamivudin und Abacavir	Original: Kivexa (ViiV) Generika: Mepha, Sandoz	Tabletten: 600 mg ABC und 300 mg 3TC	1 Tabl. 1× täglich	
FTC und TAF	Emtricitabin und Tenofovir afenamid fumarat	Descovy (Gilead)	Tabletten: 10 mg oder 25 mg TAF und 200 mg FTC	1 Tabl. 1× täglich	siehe Moleküle
FTC und TDF	Emtricitabin und Tenofovir disoproxil fumarat	Original: Truvada (Gilead) Generika: Mepha, Mylan, Sandoz	Tabletten: 245 mg TDF und 200 mg FTC	1 Tabl. 1× täglich, ¶	
<b>FIXKOMBINATION NRTI UND INI</b>					
3TC und DTG	Lamivudin und Dolutegravir	Dovato (ViiV)	Tabletten: 50 mg DTG und 300 mg 3TC	1 Tabl. 1× täglich	siehe Moleküle
<b>FIXKOMBINATION NNRTI UND INI</b>					
DTG und RPV	Dolutegravir und Rilpivirin	Juluca (ViiV)	Tabletten: 50 mg DTG und 25 mg RPV	1 Tabl. 1× täglich, ¶	siehe Moleküle

## FIXKOMBINATIONEN MIT 3 ODER MEHR MOLEKÜLEN

Kürzel	Moleküle	Produkte	Formen	Standarddosis Erwachsene	Nebenwirkungen
TDF, FTC und EVG/c	Tenofovir disoproxil fumarat, Emtricitabin und Elvitegravir/Cobicistat	Stribild (Gilead)	Tablette: 245 mg TDF, 200 mg FTC, 150 mg EVG und 150 mg Cobi	1 Tabl. 1× täglich, ¶	
TAF, FTC und EVG/c	Tenofovir afenamid fumarat, Emtricitabin und Elvitegravir/Cobicistat	Genvoya (Gilead)	Tabletten: 10 mg TAF, 200 mg FTC, 150 mg EVG und 150 mg Cobi	1 Tabl. 1× täglich, ¶	
TDF, FTC und EFV	Tenofovir disoproxil fumarat, Emtricitabin und Efavirenz	Original: Atripla (Gilead) Generika: Mepha, Mylan	Filmtabletten: 245 mg TDF (entspricht 300 mg TAF), 200 mg FTC und 600 mg EFV	1 Tabl. 1× täglich Auf nüchternen Magen vor dem Schlafengehen	
TDF, FTC und RPV	Tenofovir disoproxil fumarat, Emtricitabin und Rilpivirin	Eviplera (Gilead)	Tabletten: 245 mg TDF, 200 mg FTC und 25 mg RPV	1 Tabl. 1× täglich, ¶	siehe Moleküle
TAF, FTC und RPV	Tenofovir afenamid fumarat, Emtricitabin und Rilpivirin	Odefsey (Gilead)	Tabletten: 25 mg TAF, 200 mg FTC und 25 mg RPV	1 Tabl. 1× täglich	
TAF, FTC und BIC	Tenofovir afenamid fumarat, Emtricitabin und Bictegravir	Biktarvy (Gilead)	Tabletten: 25 mg TAF, 200 mg FTC und 50 mg BIC	1 Tabl. 1× täglich	
TDF, 3TC und DOR	Tenofovir disoproxil fumarat, Lamivudin und Doravirin	Delstrigo (MSD)	Tabletten: 300 mg TDF, 300 mg FTC und 100 mg DOR	1 Tabl. 1× täglich	
TAF, FTC und DRV/c	Tenofovir afenamid fumarat, Emtricitabin, Darunavir und Cobicistat	Symtuza (Janssen)	Tabletten: 10 mg TAF, 200 mg FTC, 800 mg DRV und 150 mg Cobi	1 Tabl. 1× täglich	
ABC, 3TC und DTG	Abacavir, Lamivudin und Dolutegravir	Triumeq (ViiV)	Tabletten: 600 mg ABC, 300 mg 3TC und 50 mg DTG	1 Tabl. 1× täglich	

¶ zu einer Mahlzeit einnehmen

**Wechselwirkung zwischen HIV-Behandlungen, dieser Behandlungen mit anderen Medikamenten oder psychoaktiven Substanzen: [hiv-druginteractions.org/checker](https://www.hiv-druginteractions.org/checker)**

**Im Falle einer Schwangerschaft sind Nevapirin und alle Kombinationen mit Cobicistat zu vermeiden. Dolutegravir, Efavirenz und Tenofovir (TAF oder TDF) sind die zu bevorzugenden Moleküle.**

Diese Übersicht wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Alle Informationen müssen immer im Rahmen der entsprechenden medizinischen Beratung genutzt werden. Die Übersicht enthält lediglich eine Auswahl der verfügbaren Informationen über antiretrovirale Wirkstoffe. Für eine vollständige Beschreibung der Medikamente (Nebenwirkungen etc.) fragen Sie bitte Ihre Ärztin/ Ihren Arzt um Rat, lesen Sie die Verpackungsbeilage oder besuchen Sie die Websites [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch) und [compendium.ch](http://compendium.ch).

Sie können diese Tabelle auf [shop.aids.ch/seropo](http://shop.aids.ch/seropo) herunterladen. 8. aktualisierte Ausgabe 2023 (online verfügbar) D / F

